

**Nazwa produktu – Fraxial 50 EC**

Kategoria główna	ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Podkategoria	HERBICYD
Opis	<p><b>OPIS DZIAŁANIA</b> Fraxial 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy).</p> <p><b>DZIAŁANIE NA CHWASTY</b> Fraxial 50 EC jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, szybko przemieszczającym się do stożków wzrostu pędów i korzeni. W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe lub chloroza. Szczególnie są one wyraźne widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołka wzrostu. Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyńiec polny</p> <p><b>STOSOWANIE ŚRODKA</b> Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych (BBCH chwastów 10- 19), tj.: od pojawienia się pierwszego liścia z pochewki liściowej do fazy dziewięciu lub więcej liści, na chwasty aktywnie rosnące i niezakryte przez roślinę uprawną. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego</p>
Hodowla/ Producent	Syngenta
Opakowanie	1L, 5L
Ograniczenia logistyczne (ADR/Temperatura)	UN 3082
Przeznaczenie (uprawa(y))	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary
Substancja(e) aktywne / Skład	pinoksaden – 50g/l