

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANY TERMIN STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA [kg/ha]	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ
Zboża	2-3	Jesień - od fazy 3 liści. Wiosna - od momentu ruszenia vegetacji do widocznego 2 kolanka (zalecany zabieg do 1 kolanka)	0,3-1,5	200-300
Rzepak	1-2	Jesień - od fazy 4 liści. Wiosna - od ruszenia vegetacji do momentu kwitnienia.	0,3 - 1,0	200-300
Kukurydza	1-2	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu tak aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość.	0,4 - 0,8	200-300
Buraki	1-2	Od fazy 3-4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	0,5 - 1,0	200-300
Ziemniaki	1-2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	0,5 - 1,0	200-300
Rośliny strączkowe	1-2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	0,5 - 1,0	200-300
Drzewa i krzewy owocowe	2-3	Profilaktycznie - stosować w całym okresie vegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,5 - 1,0	500-1000
Warzywa	2-3	Profilaktycznie - w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,2-0,6	300-500
Użytki zielone	2-3	Od ruszenia vegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	0,3-1,0	200-300