

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANE TERMINY STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA [l/ha]	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ [l/ha]
Zboża	2-3	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło.	0,5	200-300
Rzepak	2-3	Jesień - od fazy 3-4 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od momentu ruszenia wegetacji do fazy zielonego pąka	0,5	200-300
Kukurydza	1-3	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość.	0,5	200-300
Buraki	2-3	Od fazy 3-4 liści. Możliwość stosowania do okresu zwarcia międzyrzędzi.	0,5	200-300
Ziemniaki	1-3	Od pełnych wschodów roślin. Możliwość stosowania do fazy kwitnienia.	0,5	200-300
Rośliny strączkowe	1-2	Od fazy 2-3 liści. Zalecany termin stosowania przy intensywnym rozwoju liści i pędów.	0,5	200-300
Drzewa owocowe	2-3	Od fazy zielonego pąka do momentu dojrzewania owocu (nie później niż 21 dni przed zbiorem owoców).	0,5	500-1000
Krzewy owocowe	2-3	Pierwszy zabieg przed kwitnieniem roślin. Kolejne zabiegi do momentu dojrzewania owoców	0,5	500-1000
Warzywa	2-3	W całym okresie wegetacji, w czasie intensywnego wzrostu (nie później niż 21 dni przed zbiorem warzyw)	0,5	300-500
Łąki i pastwiska	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Stosować w całym okresie wiosenno-letnim w odstępach 14-21 dniowych (nie później niż 21 dni przed pokosem lub wypasem zwierząt)	0,5	200-300