

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANY TERMIN STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA [l/ha]	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ [l/ha]
Zboża	2-4	Jesień - od fazy 3 liści. Wiosna - od momentu ruszenia vegetacji do pełnej dojrzałości ziarna.	2,0-4,0	200-300
Rzepak	2-4	Jesień - od fazy 3 liści. Wiosna - od ruszenia vegetacji do momentu kwitnienia.	2,0-4,0	200-300
Kukurydza	2-4	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość.	3,0-4,0	200-300
Buraki	2-3	Od fazy 3-4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	2,0-4,0	200-300
Ziemniaki	2-3	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	2,0-4,0	200-300
Rośliny strączkowe	2-3	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	2,0-4,0	200-300
Drzewa i krzewy owocowe	2-4	Profilaktycznie - stosować w całym okresie vegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru lub słabej kondycji roślin, powtórzyć po 14 dniach.	3,0-4,0	500-1000
Warzywa	2-3	Profilaktycznie - w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru lub słabej kondycji roślin, powtórzyć po 14 dniach.	2,0-4,0	300-500
Użytki zielone	2-3	Od ruszenia vegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	2,0-4,0	200-300
Trawniki, boiska, pola golfowe	3-7	Od wiosny do jesieni w całym okresie vegetacji.	Stężenie 0,3%	0,3kg/100l