

<b>UPRAWA</b>	<b>ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW</b>	<b>ZALECANY TERMIN STOSOWANIA</b>	<b>ZALECANA DAWKA [l/ha]</b>	<b>ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ [l/ha]</b>
Zboża	3 - 4	Jesień - w fazie 3-5 liści. Wiosna - od momentu ruszenia wegetacji do fazy strzelania w źdźbło.	1,0	200 - 300
Rzepak	3 - 4	Jesień - w fazie 4-8 liści. Wiosna - w momencie ruszenia wegetacji. W fazie zielonego pąka.	1,0	200 - 300
Kukurydza	2 - 3	W fazie 4-6 liści. Po osiągnięciu 50-75 cm wysokości.	1,0	200 - 300
Buraki	4 - 5	W fazie 4-8 liści. W fazie intensywnego wzrostu. Przed zwarciem międzyrzędzi. Miesiąc przez zbiorami.	1,0	200 - 300
Ziemniaki	3 - 4	W fazie zawiązywania bulw. Podczas wzrostu bulw. Przed kwitnieniem.	1,0	200 - 300
Rośliny strączkowe	3 - 4	Od fazy sześciu liści do kwitnienia. W momencie pojawienia się pierwszych strąków.	1,0	300 - 500
Jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, czereśnia	4 - 5	W fazie różowego/białego pąka. Na początku opadania płatków. Podczas kształtowania się owoców.	1,0	500 - 700
Truskawka	3 - 4	Przed kwitnieniem. Podczas kształtowania się owoców.	1,0	500 - 700
Malina, jeżyna, porzeczka	3 - 4	Przed kwitnieniem. Po kwitnieniu. Kolejny zabieg po upływie 14-21 dni później.	1,0	500 - 700
Kapusta, brokuł, kalafior	2 - 3	3-4 tygodnie po wysadzeniu rozsady. Podczas zawiązywania główek (róż).	1,0	300 - 500
Seler, marchew, pietruszka	2 - 3	W fazie 6-8 liści, po 2-3 tygodniach powtórzyć. W momencie intensywnego wzrostu korzenia.	1,0	300 - 500
Pomidor, papryka	3 - 4	Po osiągnięciu 15 cm wysokości. Przed kwitnieniem. W momencie pojawienia się pierwszych owoców.	1,0	300 - 500
Ogórek	1 - 2	Przed kwitnieniem.	1,0	300 - 500
Łąki i pastwiska	2 - 3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Stosować w całym okresie wiosenno-letnim w odstępach 14-21 dniowych.	1,0	200 - 300