

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANY TERMIN STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA [l/ha]	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ [l/ha]
Zboża	1-2	Jesień - od fazy 3 liści. Wiosna - od momentu ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego	1,0 - 2,0	200 - 300
Rzepak	1-2	Jesień - od fazy 4 liści. Wiosna - od ruszenia wegetacji do momentu kwitnienia.	0,5 - 1,0	200 - 300
Kukurydza	2-3	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu tak aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość	1,0 - 3,0	200 - 300
Buraki	1-3	Od fazy 3-4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	1,0 - 2,0	200 - 300
Ziemniaki	1-3	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	1,0 - 2,0	200 - 300
Rośliny strączkowe	1-2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia	1,0 - 2,0	200 - 300
Drzewa i krzewy owocowe	1-3	Profilaktycznie - stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	2,0 - 3,0	500 - 1000
Warzywa	1-3	Profilaktycznie - w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	1,0 - 2,0	300 - 500
Użytki zielone	2-3	Od ruszenia wegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	1,0 - 2,0	200 - 300