

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANY TERMIN STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA [l/ha]	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ [l/ha]
Zboża	2-3	Jesień - od fazy 3 liści. Wiosna - od ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego	0,5-1,5	200-300
Rzepak	2-3	Jesień - od fazy 4 liści. Wiosna - od ruszenia wegetacji do momentu kwitnienia	1,0-2,0	200-300
Kukurydza	1-2	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu tak aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość.	1,0-2,0	200-300
Buraki	2-3	Od fazy 3-4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	0,5-1,5	200-300
Ziemniaki	2-3	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	0,5-1,0	200-300
Rośliny strączkowe	1-2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	1,0-2,0	200-300
Drzewa i krzewy owocowe	2-3	Profilaktycznie - stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,5-1,0	500-1000
Warzywa	1-2	Profilaktycznie - w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,3-1,0	300-500
Użytki zielone	2-3	Od ruszenia wegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	1,0-1,5	200-300