

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANY TERMIN STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA [l/ha]	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYKOWEJ [l/ha]
Zboża	2-3	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od momentu ruszenia wegetacji do początku fazy kłoszenia.	1,0-2,0	200-300
Rzepak	2-3	Jesień - od fazy 3-4 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od ruszenia wegetacji do momentu kwitnienia.	1,0-2,0	200-300
Kukurydza	2-3	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość.	1,0-2,0	200-300
Buraki	2-3	Od fazy 3-4 liści. Możliwość stosowania do okresu zwarcia międzyrzędzi.	1,0-2,0	200-300
Ziemniaki	2-3	Od momentu wschodów roślin. Możliwość stosowania do fazy kwitnienia.	1,0-2,0	200-300
Rośliny strączkowe	2-3	Od momentu wschodów roślin. Możliwość stosowania do fazy kwitnienia.	1,0-2,0	200-300
Drzewa owocowe	2-3	Profilaktycznie - stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,5-1,5	500-1000
Krzewy owocowe	2-3	Profilaktycznie - stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,5-1,5	500-1000
Warzywa	2-3	Profilaktycznie - stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	0,5-1,5	300-500
Łąki i pastwiska	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Stosować w całym okresie wiosenno-letnim w odstępach 14-21 dniowych.	1,0-2,0	200-300