

UPRAWA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA [l/ha]
Zboża	2-4	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od momentu ruszenia vegetacji do pełnej dojrzałości ziarna.	4,0-8,0
Rzepak	2-4	Jesień - od fazy 4 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od ruszenia vegetacji do fazy zielonego pąka. Na zieloną tuszczynę.	4,0 - 7,0
Kukurydza	2-3	Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość.	4,0 - 8,0
Buraki	2-3	Od fazy 3-4 liści do zwarcia międzyrzędzi.	4,0 - 7,0
Ziemniaki	2-3	Od momentu wschodów roślin do fazy kwitnienia.	4,0 - 7,0
Rośliny strączkowe	1-2	Stosować do 15-20 cm wysokości roślin.	3,0 - 6,0
Drzewa owocowe	2-4	Profilaktycznie stosować w całym okresie vegetacji; Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoborów, powtórzyć po 14 dniach.	4,0 - 8,0
Krzewy owocowe	2-4	Profilaktycznie stosować w całym okresie vegetacji; Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoborów, powtórzyć po 14 dniach.	4,0 - 8,0
Warzywa	2-4	Profilaktycznie stosować w całym okresie vegetacji; Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoborów, powtórzyć po 14 dniach.	3,0 - 6,0
Łąki i pastwiska	1-2	Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji. Stosować w całym okresie wiosenno-letnim w odstępach 14-21 dni.	4,0 - 8,0
Trawniki, boiska i pola golfowe	2-5	Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji. Stosować w całym okresie wiosenno-letnim w odstępach 14-21 dni.	2,0 - 4,0

Ilość cieczy użytkowej l/ha:

- uprawy polowe 200-300;
- uprawy ogrodnicze 300-500,
- uprawy sadownicze 500-1000l.