

<b>Nazwa produktu – Mustang Forte 195 SE</b>	
Kategoria główna	ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Podkategoria	HERBICYD
Opis	<p><b>OPIS DZIAŁANIA</b> HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesinoemulsji do rozcieńczenia wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancje czynne aminopyralid i 2,4 D zaliczane są do grupy O.</p> <p><b>DZIAŁANIE NA CHWASTY</b> Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w chwastach. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 50C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.</p> <p>Chwasty wrażliwe przestają rosnać kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (widoczne najczęściej po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 50C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulieć czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm oraz fiołek polny przed kwitnieniem.</p> <p>Dawka 1,0 l/ha w zbożach ozimych Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulieć czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.</p> <p>Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia, przetacznik perski.</p> <p>Dawka 0,8 l/ha w zbożach jarych Chwasty wrażliwe: fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulieć czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne.</p> <p>Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny od początku fazy kwitnienia, powój polny, przetacznik perski.</p> <p><b>STOSOWANIE ŚRODKA</b> Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.</p>
Hodowla/ Producent	Corteva
Opakowanie	5L, 15L
Ograniczenia logistyczne (ADR/Temperatura)	UN 3082
Przeznaczenie (uprawa(y))	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem
Substancja(e) aktywne / Skład	2,4D 2-EHE w formie estru – 271 g/l (co odpowiada 180 g/l [17,0 %] 2,4D w formie kwasu) aminopyralid - 10 g/l florasulam - 5 g/l