

UPRAWA	ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW	ZALECANE TERMINY STOSOWANIA	ZALECANA DAWKA (L/HA)	ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ (L/HA)
Zboża	2 - 3	Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy liścia flagowego.	0,7 - 1,0	200 - 300
Rzepak	2 - 3	Jesień – od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego. Wiosna – od fazy ruszenia wegetacji do fazy zielonego pąka.	0,7 - 1,0	200 - 300
Kukurydza	1 - 2	Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.	0,7 - 1,0	200 - 300
Buraki	2 - 3	Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	0,7 - 1,0	200 - 300
Ziemniaki	2 - 3	Od fazy 2 liści właściwych do okresu zawiązywania bulw.	0,7 - 1,0	200 - 300
Rośliny bobowate	1 - 2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	0,7 - 1,0	200 - 300
Łąki i pastwiska	1 - 2	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie lub wypasie zwierząt.	0,7 - 1,0	200 - 300
Marchew, Pietruszka, Burak ćwikłowy, Cebula	2 - 3	Od wyraźnych wschodów roślin do zbiorów.	1,0 - 1,5	400 - 600
Truskawka, Malina	2 - 3	1 zabieg - początek wegetacji. 2 zabieg - początek kwitnienia.	0,9 - 1,5	700 - 1000
Jabłoń, Grusza	3 - 5	1 Pęknięcie pąków, 2 Zielony pąk, 3 Różowy pąk, 4 Początek kwitnienia, 5 Koniec kwitnienia, 6 Wykształcenie i wzrost zawiązków, 7 Intensywny wzrost owoców, 8 (7-8 tygodni) przed zbiorem owoców, 9 Po zbiorach owoców.	0,9 - 1,5	700 - 1000
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa	3 - 4	1 Pęknięcie pąków, 2 Zielony pąk, 3 Biały pąk, 4 Początek kwitnienia, 5 Koniec kwitnienia, 6 Rozwój owoców, 7 Dojrzewanie owoców, 8 Po zbiorach owoców.	0,9 - 1,5	200 - 300
Łącznie z RSM	1 - 2	Podczas aplikacji RSM	1,0 - 1,5	200 - 500